## Complément a la description de Lithobius Duboscqui VAR. EXARMATUS BR"L. (MYRIAPODES CHILOPODES).

## Par J.-M. Demange.

H. W. Brölemann décrivait en 1926 (Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, t. V) une variété nouvelle de Lithobius Duboscqui, la variété exarmatus en provenance des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer. Myriapodes des Pyrénées Orientales.

En examinant des Myriapodes d'Auvergne eapturés à Besse-en-Chandesse, par M. le Professeur Max Vachon nous avons trouvé un certain nombre de spécimens qui, manifestement, se classent dans la dite variété exarmatus, tous leurs caractères étant identiques à ceux du type sauf un seul : la griffe apicale des pattes 15 qui est double au lieu d'être simple.

Nous avons alors examiné le type de H. W. Brölemann contenu dans les collections du Muséum national ainsi que d'autres exemplaires déterminés par lui et avons pu constater que la griffe apicale d'exarmatus était, non pas simple comme l'indique le créateur de la variété, mais double. Cette seconde griffe est, il faut bien le dire, peu visible : c'est ce qui explique qu'elle ait pu échapper à H. W. Brölemann.

Par eonséquent, il est nécessaire de rectifier, d'une part, la deseription originale de 1926, page 267, de la façon suivante : les deux dernières paires de pattes sont très épaissies, les épines font complètement défaut et la griffe apicale est double, et d'autre part, dans la Faune des Myriapodes de France, 1930 — Chilopodes, page 331, le paragraphe où il est question de cette variété, paragraphe qui doit être ainsi rédigé : Individus des Pyrénées orientales et des Basses-Alpes, de taille réduite, n'ayant d'épines à aucune patte et ayant une griffe apicale double aux P. 15.

Laboratoire de Zoologie du Muséum.